



Pôle « indicateurs »

## **RECAP**

*(REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge)*

# **Tableaux statistiques 2007 - 2019**

---

## **Présentation de RECAP**

### **Objectif du recueil**

RECAP est un recueil de données continu conçu pour permettre de connaître et de suivre les caractéristiques des consommateurs de substances psychoactives pris en charge par des professionnels dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les données ainsi recueillies sont nécessaires aux pouvoirs publics pour les aider à définir et évaluer leur politique dans le domaine des drogues et notamment pour identifier les tendances dans l'utilisation de l'offre de soins. Les données nationales doivent également servir à alimenter la réflexion des professionnels de la prise en charge sur leurs propres actions.

### **Modalités du recueil**

Le recueil s'appuie sur les systèmes d'information en place dans les structures spécialisées (gestion informatisée des dossiers de patients). Les logiciels compatibles avec RECAP permettent d'extraire les informations correspondant au noyau commun de question sous la forme d'un fichier électronique suivant un format demandé par l'OFDT. Les données sont ensuite envoyées à l'OFDT. Afin de permettre une restitution la plus rapide possible, l'OFDT demande que les données lui soient transmises au 1er trimestre de l'année n+1.

### **Critères d'inclusion**

Le recueil national concerne toute personne ayant un problème d'addiction, avec ou sans substances consommées, et qui a fait l'objet d'au moins un acte dans la structure qui l'accueille au cours de l'année. Ces personnes doivent pouvoir être considérées comme engagées ou cherchant à s'engager dans un processus d'accompagnement et de soins. Elles sont physiquement présentes sur le lieu de consultation. Les personnes appartenant à l'entourage d'un consommateur ou celles venues uniquement pour obtenir de l'information ou encore celles qui ne font que passer pour chercher du matériel de réduction des risques ne doivent pas être incluses. Les personnes consommatrices de substances vues dans les consultations jeunes consommateurs sont en revanche incluses dans le recueil

## Informations recueillies

1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques des personnes prises en charge
2. Prise en charge
3. Produits consommés
4. Mode, fréquence, type et durée de consommation des produits
5. Traitements de substitution
6. Sérologies VIH et VHC
7. Hospitalisation et tentative de suicide
8. Incarcération

## Répartition en groupes

Parmi les personnes accueillies dans les CSAPA trois populations se distinguent, avec un premier groupe qui comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 39 ans, très souvent poly-consommateurs, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, un problème avec les opiacés et/ou la cocaïne. Un deuxième groupe est constitué de personnes dont l'âge moyen est 27 ans, accueillies principalement en raison de leur problème avec le cannabis alors que le troisième groupe comprend des patients dont l'âge moyen est d'environ 44 ans et qui ont un problème avec l'alcool ou le tabac. A partir des données RECAP de l'année 2014, les personnes accueillies en raison d'un problème d'addiction sans substances ne sont plus incluses dans le groupe opiacés, cocaïne et autres produits. La croissance des effectifs de cette catégorie de personnes qui présentent des profils spécifiques tendait à modifier artificiellement certaines caractéristiques des usagers d'opiacés ou de cocaïne. Les données moyennes calculées sur l'ensemble des trois catégories principales d'usagers (d'opiacés et de cocaïne, de cannabis et d'alcool ) ont une signification limitée. Les caractéristiques qui se dégagent et leurs évolutions dépendent surtout de la part de chaque groupe dans l'ensemble. Il est plus pertinent de décrire les caractéristiques spécifiques de chacune de ces trois populations.

Par commodité, le premier groupe sera désigné par l'expression « **groupe cannabis** », le deuxième par « **groupe opiacés/cocaïne et autres substances** », et le troisième par « **groupe alcool/tabac** ».

Le critère d'inclusion dans le « groupe cannabis » est que le cannabis soit cité comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti de critères d'exclusion : avoir une substance autre que le cannabis comme produit à l'origine de la prise en charge et/ou être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le critère d'inclusion dans le « groupe alcool/tabac » est que l'alcool ou le tabac soient cités comme produit consommé posant le plus de problèmes (produit n°1) ou en l'absence de produit consommé, comme produit à l'origine de la prise en charge. Ce critère d'inclusion est assorti d'un critère d'exclusion : être sous traitement de substitution aux opiacés.

Le groupe « opiacés/cocaïne et autres substances » comprend l'ensemble des personnes ne faisant pas partie des deux groupes précédents et pour lesquelles on dispose d'une information sur le produit consommé ou à l'origine de la prise en charge. Depuis 2014, il existe également un critère d'exclusion : avoir comme produit 1 ou comme produit à l'origine de la prise en charge une addiction sans substances.

L'information sur les produits ou sur les addictions est absente pour environ 15 % des personnes vues dans les CSAPA en 2019.

Pour le détail des questions RECAP, pour consulter le guide du questionnaire RECAP, le protocole européen d'enregistrement des demandes de traitement, voir les documents en ligne consultable à l'adresse : <http://www.ofdt.fr/enquetes/recap/presentation/>

## Liste des tableaux

### 1. Nombre et caractéristiques socio-démographiques de personnes ayant un problème d'addiction prises en charge dans un CSAPA

Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP

Tableau 2 - Répartition par sexe

Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)

Tableau 4 - Répartition par âge

Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants

Tableau 6 - Répartition suivant la CSP

Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage

Tableau 8 - Répartition suivant le logement

Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources

Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle

Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude

### 2. Origine et ancienneté de la prise en charge

Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la PEC

Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de PEC antérieures

Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première PEC

### 3. Produits consommés, autres addictions des personnes prises en charge

Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé

Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la PEC)

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé

Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé

Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens

Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j

Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis

Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j

### 4. Modes, fréquences, types, durée de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

Tableau 34 - Age moyen lors de la première injection

Tableau 35 - Répartition suivant le partage des seringues

### 5. Traitements de substitution et autres traitements

Tableau 36 - Répartition suivant le traitement de substitution aux opiacés en cours

Tableau 37 - Répartition suivant la durée des traitements de substitution aux opiacés en cours

Tableau 38 - Répartition des patients ayant suivi au moins un autre traitement

### 6. Sérologies VIH et VHC

Tableau 39 - Répartition suivant la sérologie VIH

Tableau 40 - Répartition suivant la sérologie VHC

Tableau 41 - Répartition suivant la vaccination VHB complète

### 7. Hospitalisation et tentative de suicide

Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'hospitalisation pour raison psychiatrique

Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence de tentatives de suicide

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

### 8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

source pour tous les tableaux ci-dessous : RECAP 2019/OFDT

**1. Nombre et caractéristiques socio – démographiques des personnes prises en charge**
**Tableau 1 - Nombre de personnes incluses dans RECAP en 2019**

	N	%
1.Groupe cannabis	34 667	19,0
2.Groupe opiacés, cocaïne, autres produits	47 640	26,1
3.Groupe alcool	93 221	51,1
4.Groupe addictions sans substances	7 057	3,9
Total avec information sur les produits (1+2+3)	182 585	100,0
Total sans informations sur les produits	33 257	15,4
Total général	216 235	100,0

**Tableau 2 - Répartition par sexe**

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Homme	29 599	85,5	36 673	77,0	70 583	75,8	166 845	77,2
Femme	5 029	14,5	10 938	23,0	22 543	24,2	49 148	22,8
Total réponses "utiles" Sexe	34 628	100,0	47 611	100,0	93 126	100,0	215 993	100,0
Taux de réponse		99,9		99,9		99,9		99,9

**Tableau 3 - Age (moyenne et médiane)**

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	34 552		47 521		92 953		215 429	
moyenne	27,2		39,4		44,4		39,8	
écart-type	9,4		9,9		13,2		13,6	
médiane	25,0		39,0		45,0		39,0	

**Tableau 4 - Répartition par âge**

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Moins de 20 ans	8 065	23,3	649	1,4	2 409	2,6	14 839	6,9
Dont moins de 18 ans	3 990	11,5	270	0,6	1 234	1,3	7 951	3,7
De 20 à 24 ans	8 498	24,6	2 078	4,4	4 153	4,5	17 727	8,2
De 25 à 29 ans	6 390	18,5	4 650	9,8	6 448	6,9	20 945	9,7
De 30 à 39 ans	7 725	22,4	18 011	37,9	21 529	23,2	56 972	26,4
De 40 à 49 ans	2 809	8,1	14 291	30,1	25 101	27,0	51 467	23,9
De 50 à 59 ans	941	2,7	6 695	14,1	20 878	22,5	35 466	16,5
Plus de 60 ans	124	0,4	1 147	2,4	12 435	13,4	18 013	8,4
Total réponses "utiles" Age	34 552	100,0	47 521	100,1	92 953	100,1	215 429	100,0
Taux de réponse		99,7		99,8		99,7		99,6

**Tableau 5 - Répartition suivant le nombre d'enfants**

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sans enfant	25 495	76,7	24 716	54,7	36 530	40,3	95 239	52,4
1 enfant	3 645	11,0	9 387	20,8	17 064	18,8	31 622	17,4
2 enfants ou plus	4 107	12,4	11 080	24,5	36 969	40,8	55 051	30,3
Total réponses "utiles" Nb enfants	33 247	100,1	45 183	100,0	90 563	99,9	181 912	100,1
Taux de réponse		95,9		94,8		97,1		84,1

**Tableau 6 - Répartition suivant la CSP**

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Agriculteur	107	0,4	210	0,5	798	1,0	1 161	0,7
Artisan commerçant	716	2,5	1 555	3,8	3 836	4,9	6 420	4,0
Cadre Prof Libérale	429	1,5	1 097	2,7	4 271	5,4	6 326	4,0
Profession intermédiaire	455	1,6	1 112	2,7	3 179	4,0	5 133	3,2
Employé	7 828	27,6	12 413	30,4	28 132	35,6	51 424	32,3
Ouvrier	5 577	19,7	10 484	25,6	17 653	22,4	35 085	22,0
Retraité	49	0,2	298	0,7	5 251	6,7	6 085	3,8
Autres Pers sans profession hors retraités et chômeurs	13 206	46,6	13 722	33,6	15 806	20,0	47 653	29,9
Total réponses "utiles" CSP	28 367	100,1	40 891	100,0	78 926	100,0	159 287	99,9
Taux de réponse		81,8		85,8		84,7		73,7

Tableau 7 - Répartition suivant l'entourage

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Vit seul	7 043	21,7	15 920	36,0	33 583	37,3	59 605	33,2
Vit avec ses parents	13 583	41,8	7 281	16,5	10 991	12,2	35 981	20,0
Vit seul(e) avec enfant(s)	841	2,6	2 348	5,3	5 378	6,0	9 111	5,1
Vit avec un conjoint seulement	2 996	9,2	5 921	13,4	15 106	16,8	25 585	14,2
Vit avec conjoint et enfant(s)	3 512	10,8	6 556	14,8	16 553	18,4	28 524	15,9
Vit avec des amis	707	2,2	1 544	3,5	1 715	1,9	4 133	2,3
Vit en établissement pénitentiaire	1 450	4,5	2 433	5,5	2 824	3,1	7 088	3,9
Autre	2 372	7,3	2 173	4,9	3 811	4,2	9 596	5,3
Total réponses "utiles" Entourage	32 504	100,1	44 176	99,9	89 961	99,9	179 623	99,9
Taux de réponse		93,8		92,7		96,5		83,1

Tableau 8 - Répartition suivant le logement

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Durable indépendant	14 118	43,4	25 933	57,6	66 265	73,8	113 346	63,0
Durable chez des proches	12 496	38,4	7 161	15,9	10 099	11,2	33 435	18,6
Durable en institution	601	1,8	787	1,7	1 552	1,7	3 181	1,8
Provisoire chez des proches	1 708	5,3	3 332	7,4	3 924	4,4	9 425	5,2
Provisoire en institution	2 121	6,5	3 760	8,3	4 296	4,8	10 783	6,0
Autre Provisoire	1 040	3,2	1 810	4,0	2 063	2,3	5 145	2,9
Etablissement pénitentiaire	-	-	-	-	-	-	-	-
SDF	436	1,3	2 254	5,0	1 602	1,8	4 590	2,6
Total réponses "utiles" Logement	32 520	99,9	45 037	99,9	89 801	100,0	179 905	100,1
Taux de réponse		93,8		94,5		96,3		83,2

Tableau 9 - Répartition suivant l'origine des ressources

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Revenus d'emplois	11 553	36,6	15 786	35,3	43 172	48,9	74 729	41,3
Retraites ou pensions d'invalidité	196	0,6	930	2,1	7 247	8,2	9 050	5,0
ASSEDIC	2 546	8,1	4 619	10,3	9 103	10,3	16 853	9,3
RSA	2 678	8,5	9 291	20,8	10 951	12,4	23 511	13,0
AAH	1 120	3,5	4 310	9,6	5 588	6,3	11 788	6,5
Autres prestations sociales	759	2,4	1 009	2,3	1 638	1,9	3 633	2,0
Ressources provenant d'un tiers	4 967	15,7	1 221	2,7	1 992	2,3	10 693	5,9
Autres ressources (y compris sans revenus)	7 775	24,6	7 535	16,9	8 683	9,8	30 590	16,9
Total réponses "utiles" Origine des ressources	31 594	100,0	44 701	100,0	88 374	100,1	180 847	99,9
Taux de réponse		91,1		93,8		94,8		83,6

Tableau 10 - Répartition suivant la situation professionnelle

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Activité rémunérée continue	7 253	25,4	11 436	28,8	34 155	42,2	56 535	35,2
CDD de plus de 6 mois	814	2,9	999	2,5	1 142	1,4	3 197	2,0
Activité rémunérée intermittente	3 614	12,7	4 546	11,5	6 383	7,9	15 231	9,5
Chômage	5 368	18,8	10 341	26,1	16 618	20,5	33 774	21,0
Etudiant, élève, stage non rémunéré	6 932	24,3	1 123	2,8	2 782	3,4	13 637	8,5
Retraité	45	0,2	376	0,9	7 318	9,0	8 307	5,2
Autre inactif	4 490	15,7	10 830	27,3	12 470	15,4	30 094	18,7
Total réponses "utiles" Situation Professionnelle	28 516	100,0	39 651	99,9	80 868	99,8	160 775	100,1
Taux de réponse		82,3		83,2		86,7		74,4

Tableau 11 - Répartition suivant le niveau d'étude

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pas terminé le primaire	123	0,5	217	0,6	438	0,7	838	0,6
Niveau primaire	1 045	4,0	1 468	4,2	2 462	3,7	5 580	4,1
Niveau BEPC	5 936	22,5	5 504	15,9	9 170	13,7	22 608	16,5
Niveau BEP, CAP	9 806	37,2	15 441	44,7	27 574	41,1	54 963	40,1
Niveau Bac	6 354	24,1	6 495	18,8	11 785	17,6	26 687	19,5
Niveau Bac+2	1 834	7,0	2 915	8,4	7 715	11,5	13 588	9,9
Niveau au-delà Bac+2	1 265	4,8	2 520	7,3	7 879	11,8	12 926	9,4
Total réponses "utiles" Niveau scolaire	26 363	100,1	34 560	99,9	67 023	100,1	137 190	100,1
Taux de réponse		76,0		72,5		71,9		63,4

## 2. Origine et ancienneté de la prise en charge

Tableau 12 - Répartition suivant l'origine de la PEC

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Le patient lui-même	7 936	26,2	24 468	55,9	36 399	43,3	74 045	43,2
Les proches (familles/amis)	2 939	9,7	2 913	6,7	4 909	5,8	12 747	7,4
Médecin de ville	926	3,1	3 804	8,7	7 936	9,4	13 338	7,8
CSAPA, assimilé	248	0,8	2 834	6,5	996	1,2	4 360	2,5
Structures de RDR	67	0,2	710	1,6	311	0,4	1 196	0,7
Structure spécialisée en alcoologie	91	0,3	474	1,1	2 283	2,7	2 949	1,7
Equipe de liaison	235	0,8	646	1,5	2 910	3,5	4 490	2,6
Autre hôpital/autre sanitaire	1 374	4,5	2 458	5,6	6 752	8,0	11 335	6,6
Institutions et services soc	1 584	5,2	971	2,2	3 489	4,1	6 893	4,0
Obligation de soins	8 251	27,3	2 688	6,1	11 523	13,7	23 374	13,6
Injonction thérapeutique ou autre mesure présentencielle	2 046	6,8	698	1,6	2 886	3,4	5 794	3,4
Classement avec orientation	2 227	7,4	311	0,7	1 298	1,5	3 981	2,3
Autre mesure judiciaire ou administrative	607	2,0	187	0,4	201	0,2	1 200	0,7
Milieu scolaire/universitaire	1 086	3,6	141	0,3	720	0,9	2 866	1,7
Autre	642	2,1	489	1,1	1 490	1,8	2 984	1,7
Total réponses "utiles" Origine de la PEC	30 259	100,0	43 792	100,0	84 103	99,9	171 552	99,9
Taux de réponse		87,3		91,9		90,2		79,3

Tableau 13 - Répartition suivant l'existence de PEC antérieures

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jamais été pris en charge	15 442	76,8	10 742	34,3	22 996	55,6	54 093	54,6
Suivi actuellement	3 021	15,0	10 004	32,0	11 461	27,7	25 222	25,5
Déjà été pris en charge (mais plus actuellement)	1 645	8,2	10 554	33,7	6 892	16,7	19 683	19,9
Total réponses "utiles" PEC antérieure	20 108	100,0	31 300	100,0	41 349	100,0	98 998	100,0
Taux de réponse		58,0		65,7		44,4		45,8

Tableau 14 - Répartition suivant l'année de la première PEC

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Cette année	225	16,2	751	8,4	863	13,6	1 929	11,2
Un à deux ans auparavant	340	24,5	1 406	15,7	1 419	22,4	3 293	19,1
Trois à cinq ans auparavant	371	26,7	2 406	26,9	1 676	26,5	4 620	26,7
plus de 5 ans auparavant	453	32,6	4 368	48,9	2 366	37,4	7 439	43,0
Total réponses "utiles" Année de la première PEC	1 389	100,0	8 931	99,9	6 324	99,9	17 281	100,0
Taux de réponse		4,0		18,7		6,8		8,0

## 3. Produits utilisés, modes et fréquences de consommation des personnes prises en charge

Tableau 15 - Répartition suivant le nombre de produits consommés dans le mois passé

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Un seul produit	13 793	41,8	11 986	26,8	39 907	44,7	66 750	39,6
2 produits	12 155	36,8	12 923	28,9	35 222	39,5	60 733	36,0
3 produits	5 698	17,3	11 362	25,4	11 195	12,5	28 376	16,8
4 produits et plus	1 358	4,1	8 395	18,8	2 918	3,3	12 698	7,5
Total réponses "utiles" nombre de produits	33 004	100,0	44 666	99,9	89 242	100,0	168 557	99,9
Taux de réponse		95,2		93,8		95,7		78,0

Tableau 16 - Répartition suivant les produits consommés, quel que soit le rang de citation du produit

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool	8 815	26,4	15 755	34,5	78 325	87,3	103 656	59,0
Tabac	20 536	61,5	28 108	61,6	59 666	66,5	109 986	62,6
Cannabis	32 977	98,7	18 790	41,2	19 116	21,3	71 351	40,6
Benzodiazépines	207	0,6	3 213	7,0	960	1,1	4 400	2,5
GHB/GBL	8	-	731	1,6	11	-	251	0,1
Antidépresseurs	67	0,2	275	0,6	171	0,2	976	0,6
Barbituriques	31	0,1	192	0,4	91	0,1	405	0,2
GHB_GBL	16	-	231	0,5	38	-	248	0,1
Héroïne	461	1,4	20 631	45,2	1 558	1,7	22 667	12,9
Autres opiacés	120	0,4	3 552	7,8	321	0,4	4 003	2,3
Buprénorphine haut dosage	51	0,2	3 743	8,2	221	0,2	4 019	2,3
Méthadone	39	0,1	3 747	8,2	99	0,1	3 887	2,2
Fentanyl	1	-	168	0,4	7	-	176	0,1
Cocaïne*	1 817	5,4	11 342	24,9	3 670	4,1	15 773	9,0
Crack**	486	1,5	6 178	13,5	1 000	1,1	8 659	4,9
Autres dérivés cocaïne	12	-	79	0,2	8	-	100	0,1
MDMA et dérivés	680	2,0	1 195	2,6	487	0,5	2 376	1,4
Amphétamines	286	0,9	807	1,8	240	0,3	1 338	0,8
Methamphetamines	41	0,1	224	0,5	30	-	297	0,2
Cathinones synthétiques	14	-	310	0,7	12	-	340	0,2
Autres stimulants	58	0,2	284	0,6	145	0,2	491	0,3
LSD	262	0,8	620	1,4	207	0,2	1 092	0,6
Champignons	49	0,1	116	0,3	69	0,1	236	0,1
Kétamine	107	0,3	294	0,6	70	0,1	471	0,3
Autres hallucinogènes	107	0,3	294	0,6	70	0,1	471	0,3
Colles et solvants	19	0,1	320	0,7	32	-	379	0,2
Autres produits	194	0,6	1 255	2,8	391	0,4	1 884	1,1
Jeux d'argent	198	0,6	153	0,3	546	0,6	3 101	1,8
Cyberaddiction	400	1,2	68	0,1	310	0,3	2 963	1,7
Trouble léger du comportement alimentaire	78	0,2	122	0,3	455	0,5	2 032	1,2
Autre addiction sans produit	95	0,3	80	0,2	234	0,3	1 534	0,9
Pas de produit consommé	1 042	3,0	1 670	3,5	2 757	3,0	38 587	17,8
Total réponses "utiles" Produits	33 403	207,2	45 626	272,8	89 719	190,7	175 765	228,4
Taux de réponse		96,4		95,8		96,2		81,3

\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

Tableau 17 - Répartition suivant le produit à l'origine de la prise en charge (ou produit 1 si pas de produit à l'origine de la PEC)

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool	-	-	3 730	7,9	78 809	84,5	82 655	45,4
Tabac	-	-	506	1,1	10 846	11,6	11 387	6,3
Cannabis	34 667	100,0	1 391	3,0	2 405	2,6	38 525	21,2
Benzodiazépines	-	-	1 154	2,5	41	-	1 196	0,7
Autres hypnot. et tranquillisants	-	-	331	0,7	1	-	73	-
Antidépresseurs	-	-	124	0,3	8	-	341	0,2
Barbituriques	-	-	77	0,2	8	-	132	0,1
GHB_GBL	-	-	72	0,2	7	-	86	-
Héroïne	-	-	21 468	45,6	365	0,4	21 853	12,0
Autres opiacés	-	-	2 951	6,3	97	0,1	3 064	1,7
Buprénorphine haut dosage	-	-	2 868	6,1	49	0,1	2 921	1,6
Méthadone	-	-	2 476	5,3	51	0,1	2 531	1,4
Fentanyl	-	-	116	0,2	7	-	124	0,1
Cocaïne*	-	-	5 052	10,7	292	0,3	5 351	2,9
Crack**	-	-	2 533	5,4	77	0,1	2 611	1,4
Autres dérivés cocaïne	-	-	37	0,1	2	-	39	-
MDMA et dérivés	-	-	231	0,5	16	-	248	0,1
Amphétamines	-	-	239	0,5	2	-	246	0,1
Methamphetamines	-	-	164	0,3	21	-	262	0,1
Cathinones synthétiques	-	-	244	0,5	11	-	176	0,1
Autres stimulants	-	-	88	0,2	4	-	93	0,1
LSD	-	-	123	0,3	18	-	142	0,1
Champignons	-	-	27	0,1	1	-	28	-
Kétamine	-	-	35	0,1	3	-	39	-
Autres hallucinogènes	-	-	88	0,2	1	-	91	-
Colles et solvants	-	-	88	0,2	3	-	91	-
Autres produits	-	-	832	1,8	76	0,1	920	0,5
Jeux d'argent	-	-	9	-	-	-	2 231	1,2
Cyberaddiction	-	-	2	-	-	-	2 155	1,2
Trouble léger du comportement alimentaire	-	-	2	-	-	-	1 302	0,7
Autre addiction sans produit	-	-	1	-	-	-	1 091	0,6
Total réponses "utiles" Produits	34 667	100,0	47 059	100,3	93 221	99,9	182 004	99,8
Taux de réponse		100,0		98,8		100,0		84,2

\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

Tableau 18 - Répartition suivant le produit consommé posant le plus de problèmes (produit 1)

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 1	-	-	4 599	10,3	73 803	82,7	78 470	45,2
Tabac 1	-	-	1 460	3,3	13 956	15,6	15 478	8,9
Cannabis 1	33 004	100,0	3 350	7,5	1 483	1,7	37 871	21,8
Benzodiazépines 1	-	-	1 339	3,0	-	-	1 344	0,8
Autres hypnot. et tranquillisants 1	-	-	338	0,8	-	-	70	-
Antidépresseurs 1	-	-	121	0,3	-	-	340	0,2
Barbituriques 1	-	-	62	0,1	-	-	121	0,1
GHB_GBL1	-	-	70	0,2	-	-	62	-
Héroïne 1	-	-	16 088	36,0	-	-	16 089	9,3
Autres opiacés 1	-	-	2 584	5,8	-	-	2 585	1,5
Buprénorphine haut dosage 1	-	-	2 297	5,1	-	-	2 297	1,3
Méthadone 1	-	-	1 977	4,4	-	-	1 977	1,1
Fentanyl1	-	-	97	0,2	-	-	97	0,1
Cocaïne 1*	-	-	5 025	11,3	-	-	4 997	2,9
Crack 1**	-	-	3 065	6,9	-	-	3 101	1,8
Autres dérivés cocaïne 1	-	-	63	0,1	-	-	63	-
MDMA et dérivés 1	-	-	245	0,5	-	-	245	0,1
Amphétamines 1	-	-	229	0,5	-	-	242	0,1
Methamphétamines 1	-	-	117	0,3	-	-	229	0,1
Cathinones synthétiques 1	-	-	241	0,5	-	-	117	0,1
Autres stimulants 1	-	-	108	0,2	-	-	108	0,1
LSD 1	-	-	120	0,3	-	-	120	0,1
Champignons 1	-	-	23	0,1	-	-	23	-
Kétamine 1	-	-	47	0,1	-	-	47	-
Autres hallucinogènes 1	-	-	92	0,2	-	-	92	0,1
Colles et solvants 1	-	-	77	0,2	-	-	77	-
Autres produits 1	-	-	832	1,9	-	-	843	0,5
Jeux d'argent 1	-	-	-	-	-	-	2 132	1,2
Cyberaddictions 1	-	-	-	-	-	-	2 105	1,2
Trouble léger du comportement alimentaire 1	-	-	-	-	-	-	1 281	0,7
Autre addiction sans produit 1	-	-	-	-	-	-	1 044	0,6
Total réponses "utiles" Produit 1	33 004	100,0	44 666	100,1	89 242	100,0	173 667	99,9
Taux de réponse		95,2		93,8		95,7		80,3
Pas de produit consommé 1	952	2,7	2 090	4,4	2 792	3,0	8 027	3,7

\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

Tableau 19 - Répartition suivant le deuxième produit consommé

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 2	5 152	26,5	5 866	17,9	3 671	7,3	15 160	14,6
Tabac 2	11 873	61,0	6 202	18,9	30 627	61,3	49 404	47,6
Cannabis 2	-	-	7 376	22,5	10 985	22,0	18 580	17,9
Benzodiazépines 2	96	0,5	891	2,7	508	1,0	1 503	1,4
Autres hypnot. et tranquillisants 2	2	-	197	0,6	5	-	88	0,1
Antidépresseurs 2	37	0,2	78	0,2	72	0,1	307	0,3
Barbituriques 2	13	0,1	55	0,2	44	0,1	139	0,1
GHB_GBL2	6	-	81	0,2	19	-	80	0,1
Héroïne 2	181	0,9	2 616	8,0	510	1,0	3 313	3,2
Autres opiacés 2	58	0,3	556	1,7	142	0,3	760	0,7
Buprénorphine haut dosage 2	22	0,1	839	2,6	95	0,2	959	0,9
Méthadone 2	8	-	1 051	3,2	49	0,1	1 109	1,1
Fentanyl 2	-	-	30	0,1	5	-	35	-
Cocaïne 2*	877	4,5	3 658	11,2	1 534	3,1	6 050	5,8
Crack 2**	236	1,2	1 906	5,8	424	0,8	2 573	2,5
Autres dérivés cocaïne 2	6	-	8	-	7	-	22	-
MDMA et dérivés 2	193	1,0	308	0,9	67	0,1	570	0,5
Amphétamines 2	93	0,5	188	0,6	45	0,1	328	0,3
Methamphétamines 2	15	0,1	37	0,1	4	-	57	0,1
Cathinones synthétiques 2	8	-	33	0,1	6	-	49	-
Autres stimulants 2	17	0,1	95	0,3	37	0,1	149	0,1
LSD 2	73	0,4	116	0,4	17	-	207	0,2
Champignon 2	8	-	20	0,1	10	-	38	-
Kétamine 2	12	0,1	40	0,1	16	-	69	0,1
Autres hallucinogènes 2	19	0,1	64	0,2	12	-	95	0,1
Colles et solvants 2	3	-	125	0,4	18	-	153	0,1
Autres produits 2	89	0,5	191	0,6	202	0,4	507	0,5
Jeux d'argent 2	86	0,4	51	0,2	257	0,5	447	0,4
Cyberaddiction 2	187	1,0	20	0,1	144	0,3	422	0,4
Trouble léger du comportement alimentaire 2	34	0,2	56	0,2	303	0,6	467	0,4
Autre addiction sans produit 2	50	0,3	27	0,1	116	0,2	256	0,2
Total réponses "utiles" Produit 2	19 454	100,0	32 781	100,2	49 951	99,6	103 896	99,7
Taux de réponse		56,1		68,8		53,6		48,0
Pas de produit consommé 2	3 587	10,3	3 386	7,1	12 399	13,3	20 763	9,6

\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

Tableau 20 - Répartition suivant le troisième produit consommé

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool 3	3 438	46,7	3 353	16,9	786	5,3	7 763	18,2
Tabac 3	2 015	27,4	5 019	25,2	4 542	30,8	11 771	27,6
Cannabis 3	-	-	4 684	23,6	5 573	37,8	10 379	24,4
Benzodiazépines 3	64	0,9	573	2,9	297	2,0	936	2,2
Autres hypnot. et tranquillisants 3	1	-	122	0,6	2	-	51	0,1
Antidépresseurs 3	21	0,3	54	0,3	56	0,4	202	0,5
Barbituriques 3	15	0,2	40	0,2	39	0,3	111	0,3
GHB_GBL 3	6	0,1	47	0,2	16	0,1	62	0,1
Héroïne 3	154	2,1	1 229	6,2	541	3,7	1 930	4,5
Autres opiacés 3	34	0,5	261	1,3	110	0,7	408	1,0
Buprénorphine haut dosage 3	11	0,1	379	1,9	67	0,5	457	1,1
Méthadone 3	14	0,2	458	2,3	32	0,2	504	1,2
Fentanyl 3	-	-	23	0,1	1	-	24	0,1
Cocaïne 3*	615	8,4	1 637	8,2	1 287	8,7	3 547	8,3
Crack 3**	137	1,9	757	3,8	350	2,4	1 223	2,9
Autres dérivés cocaïne 3	2	-	4	-	-	-	6	-
MDMA et dérivés 3	222	3,0	320	1,6	165	1,1	712	1,7
Amphétamines 3	95	1,3	202	1,0	86	0,6	384	0,9
Méthamphétamines 3	11	0,1	33	0,2	8	0,1	52	0,1
Cathinones synthétiques 3	5	0,1	25	0,1	3	-	33	0,1
Autres stimulants 3	19	0,3	44	0,2	36	0,2	101	0,2
LSD 3	89	1,2	156	0,8	57	0,4	302	0,7
Champignon 3	18	0,2	32	0,2	18	0,1	68	0,2
Kétamine 3	14	0,2	31	0,2	12	0,1	57	0,1
Autres hallucinogènes 3	47	0,6	63	0,3	26	0,2	136	0,3
Colles et solvants 3	10	0,1	74	0,4	3	-	88	0,2
Autres produits 3	49	0,7	130	0,7	111	0,8	294	0,7
Jeux d'argent 3	66	0,9	49	0,2	212	1,4	346	0,8
Cyberaddiction 3	124	1,7	25	0,1	105	0,7	257	0,6
Trouble léger du comportement alimentaire 3	35	0,5	31	0,2	122	0,8	206	0,5
Autre addiction sans produit 3	28	0,4	34	0,2	86	0,6	162	0,4
Total réponses "utiles" Produit 3	7 359	100,1	19 889	100,1	14 749	100,0	42 572	100,0
Taux de réponse		21,2		41,7		15,8		19,7
Pas de produit consommé 3	2 446	7,1	2 703	5,7	5 847	6,3	11 209	5,2

\* Cocaïne poudre \*\* Crack et cocaïne basée

Tableau 21 - Nb moyen de cigarettes/j pour les fumeurs quotidiens

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
	14 530	23 740	38 063	77 682
moyenne	11,7	15,9	17,0	15,7
écart-type	7,9	9,1	10,2	9,7
médiane	10,0	15,0	15,0	15,0

Tableau 22 - Répartition des fumeurs quotidiens suivant le nombre de cigarette/j

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 à 9 cigarettes	5 330	36,7	3 932	16,6	6 665	17,5	16 279	21,0
10 à 19 cigarettes	5 751	39,6	9 659	40,7	13 561	35,6	29 473	37,9
20 à 39 cigarettes	3 248	22,4	9 259	39,0	15 738	41,3	28 705	37,0
plus de 40 cigarettes	201	1,4	890	3,7	2 099	5,5	3 225	4,2
Total réponses "utiles" Nb de cigarettes	14 530	100,1	23 740	100,0	38 063	99,9	77 682	100,1
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		70,8		84,5		63,8		70,6

Tableau 23 - Nb moyen de joints/j pour les fumeurs quotidiens de cannabis

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
	11 785	7 923	4 623	24 573
moyenne	5,6	4,2	4,6	4,9
écart-type	5,0	4,3	4,7	4,7
médiane	4,0	3,0	3,0	3,0

Tableau 24 - Répartition des fumeurs de cannabis quotidiens suivant le nombre de joints/j

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1 à 3 joints	5 032	42,7	4 795	60,5	2 547	55,1	12 494	50,8
4 à 6 joints	3 592	30,5	1 846	23,3	1 147	24,8	6 652	27,1
7 joints et plus	3 161	26,8	1 282	16,2	929	20,1	5 427	22,1
Total réponses "utiles" Nb de joints	11 785	100,0	7 923	100,0	4 623	100,0	24 573	100,0
Taux de réponse (en référence au nombre total des fumeurs)		35,7		42,2		24,2		34,4

#### 4. Modes, fréquences, types, délai de consommation suivant le produit posant le plus de problèmes

Tableau 25 - Répartition des personnes pour lesquelles l'alcool est le produit posant le plus de problèmes, suivant la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'années de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>4 599</b>	<b>73 803</b>	<b>78 470</b>
<i>Fréquence de consommation</i>				
Pas plus d'une fois au cours des 30 derniers jours		339	9 949	10 299
1 fois/sem ou moins		272	7 345	7 632
2 à 3 fois/semaine		566	13 781	14 366
4 à 6 fois/semaine		222	3 734	3 958
Chaque jour		3 025	36 082	39 123
Total réponses "utiles" Fréquence Alcool		4 424	70 891	75 378
Taux de réponse			96,2	96,1
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		363	6 172	6 548
Usage nocif		843	17 668	18 532
Dépendance		2 879	36 786	39 681
Total réponses "utiles" Usage Alcool		4 085	60 626	64 761
Taux de réponse			88,8	82,5
<i>Début d'alcoolisation</i>				
Moins de 5 ans		76	1 878	1 956
5-14 ans		470	8 288	8 766
15-19 ans		500	5 639	6 144
20-24 ans		594	6 323	6 921
25 ans et plus		1 340	21 019	22 372
Total réponses "utiles" Début Alcool 1		2 980	43 147	46 159
Taux de réponse			64,8	58,8

Tableau 26 - Répartition des personnes pour lesquelles le cannabis est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>	<b>33 004</b>	<b>3 350</b>		<b>37 871</b>
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté	-	-	-	-
Fumé/inhalé	31 782	99,1	3 224	98,8
Mangé/bu	224	0,7	37	1,1
Sniffé	-	-	-	-
Autres	58	0,2	3	0,1
Total réponses "utiles" Mode conso Cannabis	32 064	100,0	3 264	100,0
Taux de réponse		97,2		97,2
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois	3 115	9,8	272	8,4
1 fois/sem ou moins	1 850	5,8	296	9,2
2 à 3 fois/semaine	3 436	10,9	456	14,1
4 à 6 fois/semaine	1 172	3,7	98	3,0
Chaque jour	22 056	69,7	2 111	65,3
Total réponses "utiles" Fréquence Cannabis	31 629	99,9	3 233	100,0
Taux de réponse		95,8		96,5
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque	3 503	13,0	432	14,4
Usage nocif	6 051	22,5	749	25,0
Dépendance	17 358	64,5	1 813	60,6
Total réponses "utiles" Usage Cannabis	26 912	100,0	2 994	100,0
Taux de réponse		81,5		89,4
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an	210	0,8	4	0,2
1 à 5 ans	5 680	22,7	75	3,0
5 à 10 ans	6 721	26,9	177	7,0
10 ans et plus	12 404	49,6	2 267	89,9
Total réponses "utiles" Début Cannabis	25 015	100,0	2 523	100,1
Taux de réponse		75,8		75,3

Tableau 27 - Répartition des personnes pour lesquelles les benzodiazépines sont les produits posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>1 339</b>		<b>1 344</b>
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		4	0,3	4 0,3
Fumé/inhalé		-	-	- -
Mangé/bu		1 171	97,3	1 175 97,3
Sniffé		19	1,6	19 1,6
Autres		9	0,7	10 0,8
Total réponses "utiles" Mode conso Benzodiazépine		1 203	99,9	1 208 100,0
Taux de réponse			89,8	89,9
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		59	4,6	59 4,6
1 fois/sem ou moins		17	1,3	19 1,5
2 à 3 fois/semaine		48	3,7	48 3,7
4 à 6 fois/semaine		44	3,4	44 3,4
Chaque jour		1 115	86,9	1 118 86,8
Total réponses "utiles" Fréquence Benzodiazépine		1 283	99,9	1 288 100,0
Taux de réponse			95,8	95,8
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		61	5,2	61 5,2
Usage nocif		101	8,7	104 8,9
Dépendance		1 000	86,1	1 002 85,9
Total réponses "utiles" Usage Benzodiazépine		1 162	100,0	1 167 100,0
Taux de réponse			86,8	86,8
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		11	1,4	11 1,4
1 à 5 ans		116	14,6	116 14,6
5 à 10 ans		156	19,7	156 19,7
10 ans et plus		510	64,3	510 64,3
Total réponses "utiles" Début Benzodiazépine		793	100,0	793 100,0
Taux de réponse			59,2	59,0

Tableau 28 - Répartition des personnes pour lesquelles l'héroïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>16 088</b>		<b>16 089</b>
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		2 536	16,8	2 536 16,8
Fumé/inhalé		3 319	22,0	3 319 22,0
Mangé/bu		124	0,8	124 0,8
Sniffé		9 080	60,1	9 080 60,1
Autres		57	0,4	57 0,4
Total réponses "utiles" Mode conso Héroïne		15 116	100,1	15 116 100,1
Taux de réponse			94,0	94,0
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		2 335	15,4	2 335 15,4
1 fois/sem ou moins		1 485	9,8	1 485 9,8
2 à 3 fois/semaine		1 675	11,1	1 675 11,1
4 à 6 fois/semaine		766	5,1	766 5,1
Chaque jour		8 887	58,7	8 887 58,7
Total réponses "utiles" Fréquence Héroïne		15 148	100,1	15 148 100,1
Taux de réponse			94,2	94,2
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		855	7,1	856 7,1
Usage nocif		953	7,9	953 7,9
Dépendance		10 308	85,1	10 308 85,1
Total réponses "utiles" Usage Héroïne		12 116	100,1	12 117 100,1
Taux de réponse			75,3	75,3
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		43	0,4	43 0,4
1 à 5 ans		918	7,5	918 7,5
5 à 10 ans		1 771	14,5	1 771 14,5
10 ans et plus		9 451	77,6	9 451 77,6
Total réponses "utiles" Début Héroïne		12 183	100,0	12 183 100,0
Taux de réponse			75,7	75,7

Tableau 29 - Répartition des personnes pour lesquelles la méthadone est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>1 977</b>		<b>1 977</b>
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		43	2,5	43 2,5
Fumé/inhalé		63	3,6	63 3,6
Mangé/bu		1 586	91,4	1 586 91,4
Sniffé		35	2,0	35 2,0
Autres		8	0,5	8 0,5
Total réponses "utiles" Mode conso Méthadone		1 735	100,0	1 735 100,0
Taux de réponse			87,8	87,8
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		25	1,3	25 1,3
1 fois/sem ou moins		22	1,2	22 1,2
2 à 3 fois/semaine		74	3,9	74 3,9
4 à 6 fois/semaine		63	3,3	63 3,3
Chaque jour		1 699	90,2	1 699 90,2
Total réponses "utiles" Fréquence Méthadone		1 883	99,9	1 883 99,9
Taux de réponse			95,2	95,2
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		128	7,5	128 7,5
Usage nocif		41	2,4	41 2,4
Dépendance		1 542	90,1	1 542 90,1
Total réponses "utiles" Usage Méthadone		1 711	100,0	1 711 100,0
Taux de réponse			86,5	86,5
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		33	2,8	33 2,8
1 à 5 ans		295	25,3	295 25,3
5 à 10 ans		331	28,4	331 28,4
10 ans et plus		507	43,5	507 43,5
Total réponses "utiles" Début Méthadone		1 166	100,0	1 166 100,0
Taux de réponse			59,0	59,0

Tableau 30 - Répartition des personnes pour lesquelles la BHD est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis	Opioides, cocaïne, autres	Alcool	Ensemble CSAPA
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>		<b>2 297</b>		<b>2 297</b>
<i>Mode de consommation</i>				
Injecté		485	23,7	485 23,7
Fumé/inhalé		83	4,1	83 4,1
Mangé/bu		973	47,6	973 47,6
Sniffé		457	22,3	457 22,3
Autres		48	2,3	48 2,3
Total réponses "utiles" Mode conso BHD		2 046	100,0	2 046 100,0
Taux de réponse			89,1	89,1
<i>Fréquence de consommation</i>				
1 fois dans le mois		50	2,3	50 2,3
1 fois/sem ou moins		26	1,2	26 1,2
2 à 3 fois/semaine		102	4,6	102 4,6
4 à 6 fois/semaine		43	1,9	43 1,9
Chaque jour		1 998	90,0	1 998 90,0
Total réponses "utiles" Fréquence BHD		2 219	100,0	2 219 100,0
Taux de réponse			96,6	96,6
<i>Usage/dépendance</i>				
Usage à risque		120	6,4	120 6,4
Usage nocif		102	5,4	102 5,4
Dépendance		1 664	88,2	1 664 88,2
Total réponses "utiles" Usage BHD		1 886	100,0	1 886 100,0
Taux de réponse			82,1	82,1
<i>Début de la consommation</i>				
Moins d'un an		10	0,7	10 0,7
1 à 5 ans		182	13,2	182 13,2
5 à 10 ans		296	21,4	296 21,4
10 ans et plus		894	64,7	894 64,7
Total réponses "utiles" Début BHD		1 382	100,0	1 382 100,0
Taux de réponse			60,2	60,2

Tableau 31 - Répartition des personnes pour lesquelles la cocaïne est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>			<b>5 025</b>				<b>4 997</b>	
<i>Mode de consommation</i>								
Injecté			686	14,6			686	14,6
Fumé/inhalé			-	-			-	-
Mangé/bu			56	1,2			56	1,2
Sniffé			3 919	83,7			3 924	83,7
Autres			23	0,5			23	0,5
Total réponses "utiles" Mode conso Cocaïne			4 684	100,0			4 689	100,0
Taux de réponse				93,2				93,8
<i>Fréquence de consommation</i>								
1 fois dans le mois			832	17,6			831	17,7
1 fois/sem ou moins			825	17,5			823	17,5
2 à 3 fois/semaine			1 126	23,8			1 120	23,8
4 à 6 fois/semaine			239	5,1			237	5,0
Chaque jour			1 705	36,1			1 690	35,9
Total réponses "utiles" Fréquence Cocaïne			4 727	100,1			4 701	99,9
Taux de réponse				94,1				94,1
<i>Usage/dépendance</i>								
Usage à risque			442	11,2			440	11,2
Usage nocif			1 109	28,2			1 105	28,2
Dépendance			2 383	60,6			2 367	60,5
Total réponses "utiles" Usage Cocaïne			3 934	100,0			3 912	99,9
Taux de réponse				78,3				78,3
<i>Début de la consommation</i>								
Moins d'un an			44	1,3			44	1,3
1 à 5 ans			771	22,1			767	22,1
5 à 10 ans			784	22,5			778	22,4
10 ans et plus			1 893	54,2			1 884	54,2
Total réponses "utiles" Début Cocaïne			3 492	100,1			3 473	100,0
Taux de réponse				69,5				69,5

Tableau 32 - Répartition des personnes pour lesquelles le crack est le produit posant le plus de problèmes, suivant le mode de consommation, la fréquence de consommation, l'usage/dépendance, le nombre d'année de consommation

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
<b>Effectif auquel se rapporte le taux de réponse</b>			<b>3 065</b>				<b>3 101</b>	
<i>Mode de consommation</i>								
Injecté			30	1,0			30	1,0
Fumé/inhalé			2 861	97,0			2 897	97,0
Mangé/bu			14	0,5			14	0,5
Sniffé			42	1,4			42	1,4
Autres			3	0,1			3	0,1
Total réponses "utiles" Mode conso Crack			2 950	100,0			2 986	100,0
Taux de réponse				96,2				96,3
<i>Fréquence de consommation</i>								
1 fois dans le mois			356	12,1			357	12,0
1 fois/sem ou moins			360	12,2			365	12,3
2 à 3 fois/semaine			622	21,2			630	21,2
4 à 6 fois/semaine			200	6,8			202	6,8
Chaque jour			1 402	47,7			1 419	47,7
Total réponses "utiles" Fréquence Crack			2 940	100,0			2 973	100,0
Taux de réponse				95,9				95,9
<i>Usage</i>								
Usage à risque			239	9,4			242	9,4
Usage nocif			533	21,0			538	21,0
Dépendance			1 768	69,6			1 788	69,6
Total réponses "utiles" Usage Crack			2 540	100,0			2 568	100,0
Taux de réponse				82,9				82,8
<i>Début de la consommation</i>								
Moins d'un an			27	1,4			27	1,3
1 à 5 ans			494	24,8			502	24,9
5 à 10 ans			425	21,3			431	21,4
10 ans et plus			1 048	52,6			1 058	52,4
Total réponses "utiles" Début Crack			1 994	100,1			2 018	100,0
Taux de réponse				65,1				65,1

Tableau 33 - Répartition suivant l'utilisation de la voie intraveineuse

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jamais	25 987	98,0	26 371	68,1	70 309	97,7	132 140	90,0
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée	152	0,6	5 992	15,5	724	1,0	6 947	4,7
Oui dans l'année mais pas dans le mois	244	0,9	2 201	5,7	609	0,8	3 122	2,1
Oui au cours des 30 derniers jours	140	0,5	4 164	10,8	318	0,4	4 604	3,1
Total réponses "utiles" Injection	26 523	100,0	38 728	100,1	71 960	99,9	146 813	99,9
Taux de réponse		76,5		81,3		77,2		67,9

Tableau 34 - Age moyen lors de la première injection

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
moyenne	21,3		22,5		21,9		22,4	
écart-type	6,2		6,4		6,2		6,4	
médiane	20,0		20,0		20,0		20,0	

Tableau 35 - Répartition suivant le partage des seringues

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Jamais			11 533	81,2			66 728	95,5
Oui antérieurement, mais pas dans l'année passée			1 752	12,3			2 071	3,0
Oui dans l'année mais pas dans le mois			632	4,5			748	1,1
Oui au cours des 30 derniers jours			278	2,0			360	0,5
Total réponses "utiles" Partage seringue			14 195	100,0			69 907	100,1
Taux de réponse (en référence au nombre total des sujets s				111,2				458,9

## 5. Traitements de substitution et autres traitements

Tableau 36 - Répartition suivant le traitement de substitution aux opiacés en cours

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Non			11 886	29,0			107 002	78,6
Oui, Méthadone			17 948	43,8			18 023	13,2
Oui, Subutex			10 247	25,0			10 311	7,6
Oui, autre			872	2,1			883	0,6
Total réponses "utiles" Substitution			40 953	99,9			136 219	100,0
Taux de réponse				86,0				63,0

Tableau 37 - Répartition suivant la durée des traitements de substitution aux opiacés en cours

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Depuis moins de 6 mois			1 471	9,4			1 630	10,2
De 6 mois à 1 an			667	4,3			707	4,4
De 1 an à 2 ans			1 330	8,5			1 377	8,6
De 2 à 5 ans			3 490	22,4			3 558	22,2
Depuis plus de 5 ans			8 623	55,3			8 787	54,7
Total réponses "utiles" Durée Substitution			15 581	99,9			16 059	100,1
Taux de réponse (en référence au nombre total des patients				53,6				55,0

Tableau 38 - Répartition des patients ayant suivi au moins un autre traitement

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Acamprosate	21	1,1	152	1,5	1 261	8,4	1 448	5,2
Naltrexone	13	0,7	106	1,0	732	4,9	869	3,1
Antabuse	12	0,6	68	0,7	276	1,8	362	1,3
Substitut nicotinique	68	3,5	289	2,8	802	5,3	1 181	4,2
Bupropion	23	1,2	190	1,9	194	1,3	419	1,5
Anxiolytiques	1 063	55,4	6 843	66,9	9 827	65,4	18 216	64,9
Hypnotiques	338	17,6	3 083	30,1	3 281	21,8	6 864	24,5
Antidépresseurs	826	43,0	3 876	37,9	7 760	51,6	12 963	46,2
Neuroleptiques	748	39,0	3 178	31,0	2 800	18,6	7 006	25,0
Au moins un traitement cité	1 919	5,5	10 236	21,5	15 030	16,1	28 073	13,0

## 6. Sérologies VIH et VHC

Tableau 39 - Répartition suivant la sérologie VIH

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH positive	52	1,3	830	4,2	243	1,7	1 162	2,9
Sérologie VIH négative	4 069	98,7	19 113	95,8	14 062	98,3	38 583	97,1
Total réponses "utiles" VIH	4 121	100,0	19 943	100,0	14 305	100,0	39 745	100,0
Taux de réponse		11,9		41,9		15,3		18,4

Tableau 40 - Répartition suivant la sérologie VHC

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VHC positive	69	1,8	4 549	22,6	562	4,0	5 317	13,5
Sérologie VHC négative	3 857	98,2	15 594	77,4	13 330	96,0	33 978	86,5
Total réponses "utiles" VHC	3 926	100,0	20 143	100,0	13 892	100,0	39 295	100,0
Taux de réponse		11,3		42,3		14,9		18,2

Tableau 41 - Répartition suivant la vaccination VHB complète

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Vaccination VHB complète	3 299	28,6	8 924	59,9	7 789	33,4	21 160	32,2
Vaccination VHB incomplète	1 854	16,1	5 966	40,1	6 102	26,2	14 543	22,1
Total réponses "utiles" VHB	11 523	44,7	14 890	100,0	23 310	59,6	65 683	54,3
Taux de réponse		33,2		31,3		25,0		30,4

## 7. Hospitalisation et tentative de suicide

Tableau 42 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'hospitalisation pour raison psychiatrique

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	2 081	13,9	7 574	26,0	8 732	18,7	19 223	20,1
Non, jamais	12 938	86,1	21 573	74,0	37 872	81,3	76 426	79,9
Total réponses "utiles" Hospitalisation antérieure	15 019	100,0	29 147	100,0	46 604	100,0	95 649	100,0
Taux de réponse		43,3		61,2		50,0		44,2

Tableau 43 - Répartition suivant le nb d'hospitalisation pour raison psychiatrique (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une hospitalisation	821	56,7	2 278	46,5	3 206	52,7	6 569	50,7
2 ou 3 hospitalisations	426	29,4	1 604	32,8	1 900	31,2	4 085	31,5
4 hospitalisations et plus	201	13,9	1 014	20,7	982	16,1	2 297	17,7
Total réponses "utiles" Nb hospitalisations	1 448	100,0	4 896	100,0	6 088	100,0	12 951	99,9
Taux de réponse		69,6		64,6		69,7		67,4

Tableau 44 - Répartition suivant l'existence d'antécédents de tentatives de suicide

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	1 264	10,1	4 490	19,4	5 044	17,3	11 251	16,3
Non, jamais	11 194	89,9	18 626	80,6	24 133	82,7	57 576	83,7
Total réponses "utiles" TS antérieure	12 458	100,0	23 116	100,0	29 177	100,0	68 827	100,0
Taux de réponse		35,9		48,5		31,3		31,8

Tableau 45 - Répartition suivant le nb de TS (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une TS	549	60,1	1 555	49,6	2 074	56,0	4 335	53,8
Deux ou trois	254	27,8	1 071	34,2	1 189	32,1	2 615	32,5
Plus de 4 tentatives	110	12,0	506	16,2	439	11,9	1 102	13,7
Total réponses "utiles" Nb de TS	913	99,9	3 132	100,0	3 702	100,0	8 052	100,0
Taux de réponse		72,2		69,8		73,4		71,6

## 8. Incarcération

Tableau 46 - Répartition suivant l'existence d'antécédents d'incarcération

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Oui	5 642	26,4	11 419	36,8	8 781	20,6	26 663	26,1
Non, jamais	15 723	73,6	19 584	63,2	33 869	79,4	75 482	73,9
Total réponses "utiles" Existence d'incarcération	21 365	100,0	31 003	100,0	42 650	100,0	102 145	100,0
Taux de réponse		61,6		65,1		45,8		47,2

Tableau 47 - Répartition suivant le nb d'incarcérations (parmi les réponses Oui à la question précédente)

	Cannabis		Opioides, cocaïne, autres		Alcool		Ensemble CSAPA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Une incarcération	2 629	55,5	3 754	42,1	3 689	51,3	10 392	48,4
2 ou 3 incarcérations	1 481	31,3	2 760	30,9	2 115	29,4	6 541	30,5
4 incarcérations et plus	625	13,2	2 410	27,0	1 384	19,3	4 524	21,1
Total réponses "utiles" Nb incarcérations	4 735	100,0	8 924	100,0	7 188	100,0	21 457	100,0
Taux de réponse		83,9		78,2		81,9		80,5